Cleartest light Albu-Mic, einzeln eingesiegelt 20 Teststreifen

Art-Nr.: 113527 / GTIN: 6936983126007 / Marke: CLEARTEST



23,51 EUR / VE

zzgl. Versand

nicht auf Lager, wird mit Ihrer Bestellung nachbestellt.



Produktinformation

Herstellerartikelnummer (MPN):	C3 9120
PZN:	18731744

Der Test dient ausschließlich der professionellen In-Vitro-Diagnostik. Genauigkeit: >98 %, Testauswertung nach 5 Minuten Mit Urin durchführbar, Lagerung im versiegelten Beutel bei Raumtemperatur oder gekühlt (2 - 30 °C). Nicht einfrieren.

Das anhaltende Auftreten geringer Mengen Albumin im Urin (Mikroalbuminurie) kann der erste Indikator für eine Nierenfunktionsstörung sein.
Bei Diabetikern können positive Ergebnisse ein erster Hinweis auf eine diabetische Nephropathie sein.
Wenn nicht therapiert wird, steigt die Menge des freigesetzten Albumins (Makroalbuminurie) und es kommt zu einer Niereninsuffizienz.

Bei Diabetes Typ 2 ist die frühzeitige Diagnose und Therapie der diabetischen Nephropathie besonders wichtig. Albuminurie ist nicht nur die früheste Manifestation einer Nephropathie, sondern auch ein Marker für ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Diabetes Typ 2.
Unter normalen physiologischen Bedingungen werden kleine Mengen Albumin glomerulär filtriert und tubulär reabsorbiert.

Die Ausscheidung von 20 µg/ml bis 200 µg/ml Albumin im Urin wird als Mikroalbuminurie bezeichnet. Ursachen einer Albuminurie können neben einer Nierenfunktionsstörung auch körperliche Anstrengungen, Harnwegsinfekte, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz und Operationen sein.

Für die professionelle In-vitro-Diagnostik.